

* In der OASIS 4-Studie zeigte sich unter der Behandlung mit oralem Semaglutid 25 mg (Wegovy® 25 mg Tabletten) nach 64 Wochen eine geschätzte durchschnittliche Gewichtsabnahme von 16,6 %, basierend auf dem Trial Product Estimand (= Behandlungseffekt unter der Annahme, dass alle randomisierten Patienten die Behandlung fortsetzten). Dieses Ergebnis wurde nicht auf Multiplizität kontrolliert. Bei dem Treatment Policy Estimand (= Behandlungseffekt unabhängig von einem vorzeitigen Abbruch der Behandlung oder der Einleitung anderer Therapien gegen Adipositas) zeigte sich eine Gewichtsabnahme von durchschnittlich 13,6 %. Die Behandlung mit oralem Semaglutid führte in OASIS 4 zu einer überlegenen Gewichtsabnahme im Vergleich zu Placebo. OASIS 4 war eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit einer Behandlungsdauer von 64 Wochen bei 307 Erwachsenen mit einem BMI $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ oder mit einem BMI $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ bis $< 30 \text{ kg/m}^2$ mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung, ohne Typ 2 Diabetes. Die zwei co-primären Endpunkte waren die prozentuale Veränderung des Körpergewichts sowie der Anteil der Teilnehmenden mit einer Gewichtsreduktion von $\geq 5 \%$ in Woche 64 für orales Semaglutid 25 mg im Vergleich zu Placebo.¹

1. Wharton S et al. N Engl J Med. 2025;393(11): 1077–1087

Wegovy® 1,5 mg, 4 mg, 9 mg, 25 mg Tabletten. *Wirkstoff:* Semaglutid. **Sonstige Bestandteile:** Natriumalcaprozat, Magnesiumstearat. **Anwendungsgebiete:** Gewichtsregulierung mit Diät u. körperlicher Aktivität bei Erwachsenen mit BMI $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ o. $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ mit gewichtsbedingter Begleiterkrankung. **Art der Anwendung:** Zur oralen Einnahme auf nüchternen Magen nach einer empfohlenen Nüchternzeit von mindestens 8 Stunden. Unzerkaut mit einer geringen Menge Wasser. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Semaglutid oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Schwächegefühl oder Müdigkeit, Magenverstimmung oder Verdauungsstörungen. Häufig: Schwindelgefühl, Aufstoßen, Blähungen, aufgeblähter Bauch, Gastritis, gastroösophageale Refluxkrankheit, Gallensteine, Haarausfall, Veränderung des Geschmacks von Speisen oder Getränken, Veränderungen des Hautempfindens, Hypoglykämie bei Patienten mit Typ 2 Diabetes. Gelegentlich: niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl oder Benommenheit beim Aufstehen oder Aufsetzen durch einen Abfall des Blutdrucks, Herzrasen, Erhöhung der Bauchspeicheldrüsenenzyme, verzögerte Magenentleerung. Schwerwiegend: Komplikationen bei diabetischer Retinopathie (häufig), akute Pankreatitis (gelegentlich), anaphylaktische Reaktionen (selten), Angioödem (selten), nichtarterielle anteriore ischämische Optikusneuropathie (sehr selten), Darmverschluss (Häufigkeit nicht bekannt). **Warnhinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Verschreibungspflichtig. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Dänemark.** **Stand:** Juli 2026

Wegovy® ist eine eingetragene Marke der Novo Nordisk A/S, Dänemark.